

זני חסה איכותיים לקיץ

רביב

זן רומי מתאים לגידול בשטח פתוח, בתי רשת והידרופוניקה



משקל קולס: 400-800 גרם

שיווק: שוק טרי, לבבות ותעשייה

צבע: ירוק בהיר

אחידות טובה

הבשלה: 30-50 יום משתילה בהתאם לתנאי הסביבה

סבילויות*: סבילות גבוהה להפרגה ולהחמת קצות עלים (Tip Burn)

עמידויות*: פוזריום (HR: LMV, IR: Fol)

מועדי שתילה: מרץ - אוקטובר

אסף

חסה רומית המתאימה ללבבות, ראש שלם ועיבוד תעשייתי



משקל קולס: 400-800 גרם

שיווק: שוק טרי, לבבות ותעשייה

צבע: ירוק (גוון "נגה")

אחידות טובה

הבשלה: 30-50 יום משתילה בהתאם לתנאי הסביבה

התאמה טובה לגידול חסוי: הידרופוניקה ובבתי רשת


סבילויות*: סבילות גבוהה להפרגה ולהחמת קצות עלים (Tip Burn)

עמידויות*: (פוזריום) IR: Fol

מועדי שתילה: מרץ - אוקטובר

לירז

זן האייסברג המוביל לגידול קיצי



משקל קולס: 400-800 גרם

סוג ראש: כדורי מעט פחוס

צלעות: חלקות

צבע: ירוק בהיר

הבשלה: 35-45 יום משתילה בהתאם לתנאי הסביבה

סבילויות*: סבילות גבוהה להפרגה ולהחמת קצות עלים (Tip burn)

מועדי שתילה: אמצע מרץ - ספטמבר

הערה: על מנת להימנע ככל האפשר מפגיעות שמקורן

בגידול בטמפ' גבוהות, יש לדייק בטיפולים אגרוטכניים

כגון: שתילה, השקיית קליטה, הרווית חתך בהשקיית מעבר

מהתזה לטפטוף, מרחק אחיד של קולסים מהטפטפת.

ליבול מיטבי יש לתגבר דישון.

זני חסה נוספים מבית הזרע המתאימים לקיץ

נגה

טיפוס רומית



לילך

טיפוס אייסברג



רונה לי

טיפוס עלה אלון ירוק בהיר



מיאל

טיפוס עלה אלון סגול



תאריכי שתילה

שם הזן	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר
רומית												
רביב												
אסף												
אייסברג												
לירז												
לילך												
מיוחדים												
רונלי												
מיאל												
נגה												

מערך התמיכה המקצועית והמכירות של הזרע ממתין לפנייתך

וישמח לחלוק עמך מידע נוסף אודות הזנים

צפון: חוסאם קורבי 054-5656289

מרכז חוף הכרמל והבקעה: שמוליק אסאו 052-3412457

צפון הנגב, גזר וצנונית: יאנקי כרמי 054-6722743

חבל הבשור: נתנאל צוויג 054-2918109

צפון הערבה, לכיש וחוף אשדוד/אשקלון, תוצרת טרייה:

רון סלומון 052-6231712

רמת הנגב והערבה: אלעד לוי 054-5656338

מנהל קידום זנים: עוז דרורי 050-6669646

משרד: גליה 08-8508899

* הזנים כוללים את הגן/גנים העמידים, אולם רציפים עמידים עשויים להפגין סימפטומים מסוימים של מחלה או נזק במקרים של ריבוי גבוה של מזיקים/או תחת תנאים סביבתיים שליליים.

** אנא פנו להגדרה של מונח על ידי ISF באתר http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים עבור תעשיית זרעי הירקות ניתן להשיג במשרדים.